



ตารางวัคซีนไก่ชน



kaichonhub.com

➡➡➡ แนวทางเบื้องต้นสำหรับพิมพ์ติดไว้ใช้งาน <=>

อายุไก่	วัคซีนที่นิยมใช้	ป้องกันโรค	วิธีให้โดยทั่วไป	หมายเหตุ
1-7 วัน	นิวคาสเซิล + หลอดลมอักเสบติดต่อ (ND-IB)	นิวคาสเซิล, หลอดลมอักเสบ	หยอดตา / หยอดจมูก	ใช้กับลูกไก่ที่แข็งแรง
10-14 วัน	กัมโบโร (IBD)	โรคกัมโบโร	ผสมน้ำดื่ม / ตามฉลาก	เหมาะกับพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
21-28 วัน	ฝีดาษไก่	โรคฝีดาษไก่	แทงพังฝีดปีก	มักให้ช่วงอายุ 2-5 สัปดาห์
3-4 สัปดาห์	นิวคาสเซิล กระตุ้นซ้ำ	นิวคาสเซิล	หยอดตา / น้ำดื่ม / ตามฉลาก	ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
5-6 สัปดาห์	กัมโบโร กระตุ้นซ้ำ	โรคกัมโบโร	ผสมน้ำดื่ม / ตามฉลาก	แล้วแต่ความเสี่ยงของพื้นที่
8-12 สัปดาห์	พิจารณาวัคซีนเสริมตามพื้นที่	ขึ้นกับโรคประจำพื้นที่	ตามฉลากวัคซีน	ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ไก่อ่อน / ไก่โต	นิวคาสเซิล หรือ ND-IB กระตุ้นทุก 2-3 เดือน	นิวคาสเซิล, หลอดลมอักเสบ	ตามชนิดวัคซีน	สำคัญมากสำหรับไก่ชนที่เลี้ยงต่อเนื่อง
ปีละครั้ง หรือตามความเหมาะสม	ฝีดาษไก่	โรคฝีดาษไก่	แทงพังฝีดปีก	แล้วแต่โปรแกรมของฟาร์มหรือซุ้ม

ข้อควรจำก่อนให้วัคซีน



- ให้วัคซีนเฉพาะไก่ที่แข็งแรงเท่านั้น
- ถ้าไก่ซึม ป่วย เครียด หรือเพิ่งขนส่งมา ควรเลี่ยงการให้วัคซีนทันที
- อ่านฉลากวัคซีนทุกครั้ง
- เก็บวัคซีนในอุณหภูมิที่เหมาะสม โดยทั่วไป 2-8°C
- ห้ามวางวัคซีนกลางแดด
- หลังให้วัคซีนควรสังเกตอาการไก่ 1-3 วัน



หมายเหตุสำคัญ



ตารางนี้เป็นแนวทางทั่วไป อาจปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพแวดล้อม ความเสี่ยงของโรคในพื้นที่ ชนิดของวัคซีน และคำแนะนำจากสัตวแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ ควรปรึกษาปศุสัตว์อำเภอ หรือสัตวแพทย์ประจำพื้นที่ เพื่อวางโปรแกรมการทำวัคซีนที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับไก่ของท่าน



สุขภาพดี แข็งแรง ไก่ชนพร้อมชน ชนะอย่างยั่งยืน