



# ตารางถ่ายพยาธิไก่ชน

## แนวทางเบื้องต้นสำหรับพิมพ์ตีไวใช้งาน



ช่วงอายุ / ช่วงเวลา	แนวทางถ่ายพยาธิ	จุดประสงค์	สิ่งที่ควรสังเกต	หมายเหตุ
ลูกไก่ 3-4 สัปดาห์	เริ่มพิจารณาตามความเสี่ยง	ลดภาระพยาธิในช่วงเริ่มโต	น้ำหนักตัว ความแข็งแรง การกินอาหาร	ควรใช้เมื่อจำเป็นและตามคำแนะนำผู้เชี่ยวชาญ
ไก่อ่อน ทุก 1-2 เดือน	ถ่ายพยาธิตามรอบ	ช่วยให้โตดี ดูดซึมอาหารดีขึ้น	มูล น้ำหนัก ขน และ ความสดชื่น	ควรชั่งน้ำหนักก่อนใช้ยา
ไก่โต ทุก 2-3 เดือน	ถ่ายพยาธิสม่ำเสมอ	ลดการสะสมพยาธิในลำไส้	มูลผิดปกติ ซีด ซุบ หรือกินลดลง	ขึ้นกับสภาพแวดล้อมและความหนาแน่นของการเลี้ยง
ก่อนเข้าหน้าฝน	ทบทวนโปรแกรมถ่ายพยาธิ	ลดความเสี่ยงช่วงความชื้นสูง	สภาพคอก ความชื้น และ ความสะอาด	หน้าฝนเป็นช่วงเสี่ยงพยาธิและโรคมามากขึ้น
ก่อนซ้อมหนัก / ก่อนชน	ประเมินตามความเหมาะสม	ให้ร่างกายพร้อมและดูดซึมอาหารได้ดี	ความฟิต มูล การกินอาหาร	ไม่ควรถ่ายใกล้วันชนเกินไป
พ่อแม่พันธุ์ก่อนเข้าฤดูผสม	ทบทวนโปรแกรมพื้นฐาน	ลดภาระพยาธิและเสริมความสมบูรณ์	น้ำหนัก ความพร้อม และ สุขภาพโดยรวม	ควรดูร่วมกับโปรแกรมอาหารและวัคซีน



### — ข้อควรจำก่อนถ่ายพยาธิ —

- ใช้ยาถ่ายพยาธิกับไก่ที่แข็งแรงเท่านั้น
- ชั่งน้ำหนักหรือประเมินขนาดตัวก่อนใช้ยา
- อ่านฉลากยาและดูขนาดใช้ทุกครั้ง
- ไม่ควรให้ยาเกินขนาด
- ดูแลน้ำสะอาดและสังเกตมูลหลังถ่ายพยาธิ



### — หมายเหตุสำคัญ —

ตารางนี้เป็นแนวทางเบื้องต้น โปรแกรมถ่ายพยาธิอาจแตกต่างกันตามอายุ ความหนาแน่นของการเลี้ยง ความสะอาดของคอก และความเสี่ยงของพื้นที่ ควรใช้ร่วมกับการสังเกตอาการจริงและคำแนะนำจากสัตวแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ

ถ่ายพยาธิให้ถูกเวลา ไก่แข็งแรง ฟอรั่มดี พร้อมใช้งาน