



ตารางกระตุ้นวัคซีนไก่ชนประจำปี

kaichonhub.com

แนวทางเบื้องต้นสำหรับไก่อุ่น ไก่โต และพ่อแม่พันธุ์



ช่วงเวลา / ความถี่	วัคซีนที่พิจารณา	ป้องกันโรค	แนวทางการกระตุ้น	หมายเหตุ
ทุก 2-3 เดือน	นิวคาสเซิล หรือ ND-IB	นิวคาสเซิล, หลอดลมอักเสบ	กระตุ้นซ้ำตามชนิดวัคซีนและความเสี่ยง	สำคัญมากสำหรับไก่ที่เลี้ยงต่อเนื่อง
ปีละครั้ง	ฝีดาษไก่	โรคฝีดาษไก่	พิจารณาตามโปรแกรมฟาร์มหรือซุ้ม	มักใช้ทบทวนภูมิในไก่ที่เลี้ยงยาว
ก่อนฤดูฝน	ทบทวนวัคซีนหลัก	ขึ้นกับความเสี่ยงของพื้นที่	ประเมินโปรแกรมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ	ช่วงเสี่ยงโรคสูง ควรตรวจความพร้อมทั้งฝูง
ก่อนย้ายคอก / รวมฝูง	วัคซีนตามความเหมาะสม	ลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนสภาพแวดล้อม	พิจารณาตามประวัติวัคซีนเดิม	ไม่ควรทำในไก่ที่กำลังอ่อนแอหรือเครียด
พ่อแม่พันธุ์ก่อนเข้าฤดูผสม	ทบทวนวัคซีนพื้นฐาน	ช่วยลดความเสี่ยงโรคในช่วงใช้งานหนัก	ดูประวัติเดิมก่อนวางโปรแกรมใหม่	ควรดูสุขภาพโดยรวมและสภาพร่างกายร่วมด้วย



ข้อควรจำ



- กระตุ้นวัคซีนเฉพาะไก่ที่แข็งแรง
- ไม่ควรให้วัคซีนในช่วงป่วย ซึม หรือเครียด
- อ่านฉลากวัคซีนทุกครั้ง
- เก็บวัคซีนในอุณหภูมิที่เหมาะสม
- ควรมีบันทึกประวัติวัคซีนประจำตัว



หมายเหตุสำคัญ

ตารางนี้เป็นแนวทางทั่วไป โปรแกรมกระตุ้นวัคซีนอาจแตกต่างกันตามพื้นที่ ความเสี่ยงโรค ชนิดวัคซีน และสภาพการเลี้ยง ควรปรึกษาสัตวแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เมื่อวางแผนใช้งานจริง



❖ ป้องกันไว้ก่อน วางแผนดี ไก่ชนแข็งแรงอย่างยั่งยืน ❖